

FØLGJESKJEMA FOR TRIKINANALYSE

Prøve ID : _____
(Blir registrert av laboratoriet)

Namn på kunde eller oppdragsgjevar*	
Adresse*	Telefonnr. *
Kopi til	Faktura til*
E-post*	
Dato og Signatur*	
..... (prøvetakar stadfestar bestillinga, og følgjeskjemaet er å sjå på som ein avtale mellom kunde og SunnLab as).	

*Må fyllast ut av kunde

Analyseresultat og faktura blir sendt med e-post, dersom ikkje noko anna er avtalt.

Ved sending og transport:

- Meld frå til SunnLab om sendinga på førehand (e-post eller telefon).
- Prøvene skal sendast som ekspress over natta, enten med bod eller som bedriftspost, slik at dei blir leverte direkte til SunnLab på kortast mogleg tid.
- Bruk kjølelement saman med prøvane. Dette er spesielt viktig ved varmt ver.

Opplysningar om prøven

Prøvemateriale (gris, hest osv.):	
Dato for innlevering av prøve til lab.:	
Oppbevaring mellom prøvetaking og analysestart (kjøleskap, kjølebag osv.):	
Prøven skal analyserast for trikin:	Kryss av
Hasteprobe (svar på dagen) 100% tillegg:	Kryss av:

Prøvemerking	Kommentar

For laboratoriet

Motteke dato/sign.:
Analyseresultat:

Informasjon om prøveuttak:

Det er viktig at prøvane blir tekne ut på ein slik måte at dei blir mest mogleg representative for det materialet som skal analyserast. Prøvene skal analyserast så raskt som mogleg. For å hindre at prøvene vert øydelagde skal dei oppbevarast i kjøleskap til dei vert undersøkt. Dei må aldri frysast.

Vi treng 10 g reint kjøtt/muskel for å kunne homogenisere prøven. Dersom prøven inneheld sener/feitt, må det takast ut meir slik at det til slutt er minimum 10 g reint kjøtt.

Mengde prøve frå kvart dyr, sjå under for uttak av prøver:

Type dyr	Prioritert prøveuttak	Prøve- mengde	Alternativt prøveuttak	Prøve- mengde
Tamsvin, heile skrottar	Hovudmusklane i mellomgolvet ved overgangen til den senete delen	1 g	I mangel av hovudmuskel frå mellomgolvet	2 g
Avlspurker og rånar:	Hovudmusklane i mellomgolvet ved overgangen til den senete delen	2 g	I mangel av hovudmuskel frå mellomgolvet	4 g
Frittgåande gris, villsvin og hest:	Frå heile skrottar skal det takast ein prøve på minst 10 g frå ein av hovudmusklane i mellomgolvet ved overgangen til den senete delen.	10 g	I mangel av hovudmuskel frå mellomgolvet skal det takast ei dobbelt så stor prøve frå ribbeinsdelen eller brystbeinsdelen av mellomgolvet, eller frå tyggjemuskel, tungemuskel eller bukmuskel.	20 g
Kjøttstykkje og fryste prøvar	Tverrstripa muskulatur med lite feitt, og om mogleg i nærleiken av bein eller sener	5 g		
Bjørn	Mellomgolv, ytre tyggjemuskel og tunge.	10 g		
Kvalross	Mellomgolv, ytre tyggjemuskel og tunge.	10 g		
Krokodille	Ytre tyggjemuskel, vingemuskel og interkostal muskulatur.	10 g		
Fuglar	Tyggjemusklar og halsmusklar.	10 g		

OBS! I tilfelle funn av trikin vil kunde bli varsla. Det kan vere mogleg å finne andre typar parasittar, men denne metoden gjeld berre for trikin. Så sjølv om det ikkje blir påvist Trikin i prøven, kan ein ikkje garantere fritt for andre parasittar. Evt. ekstraarbeid i samband med funn vil bli belasta kunde.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønskjer meir informasjon.

© SunnLabas

Holtemyrane 6

6814 FØRDE

Tlf. 57 72 39 50

post@sunnlab.no